



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Medidas de Prevenção ao COVID-19.

Seja consciente! Seja responsável! Seja solidário!



✓ O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em ambientes fechados e abertos!





✓ No entanto, precisamos manter a precaução.

✓ Higienize sempre as mãos com álcool 70% ou água e sabão.




Tome todas as doses indicadas de vacina contra a Covid-19 e Influenza. Fortaleça sua imunidade.



Sempre que possível, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações.


✓ É recomendado que pessoas com 70 anos ou mais anos, além das com comorbidades, imunossuprimidos e com sintomas gripais continuem usando as máscaras.



Quaisquer sintomas relacionados a COVID-19 e INFLUENZA, se dirija ao serviço de atendimento médico mais próximo. Informe ao Setor de RH e inicie o período de isolamento respeitando as regras (5, 7 e 10 dias) do Ministério da Saúde.



Tosse seca



Febre



Dificuldade de respirar



Cefaleia




Dor de garganta



Diarréia



Secreções nasais



Pneumonia

QUADRO RESUMO DE MEDIDAS DE ISOLAMENTO

Tempo do início dos sintomas	5 DIAS		7 DIAS	10 DIAS
Condição de saúde	SEM SINTOMAS		SEM SINTOMAS	SEM SINTOMAS
	Ao 5º dia completo*, se o caso estiver SEM sintomas respiratórios e sem febre e sem uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas.		Ao 7º dia completo*, se o caso estiver SEM sintomas respiratórios e sem febre e sem uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas.	Ao 10º dia completo, se o caso estiver SEM sintomas respiratórios sem febre e sem uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas.
Teste	Com testagem no 5º dia com RT-PCR ou TR-Ag.		Não é necessário testar para suspender o isolamento.	Não é necessário testar para suspender o isolamento.
Resultado	RESULTADO NÃO DETECTADO/ NÃO REAGENTE	RESULTADO DETECTADO/ REAGENTE	x	x
Suspensão do isolamento	Suspender o isolamento após 5 dias completos e manter as medidas adicionais até o 10º dia completo do início dos sintomas**.	Manter o isolamento até o 10º dia completo do início dos sintomas.	Suspender o isolamento após 7 dias completos e manter as medidas adicionais até o 10º dia completo do início dos sintomas**.	Suspender o isolamento no 10º dia completo do início dos sintomas e manter as medidas de prevenção e controle***.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

CORONAVÍRUS.
A PREVENÇÃO
AINDA É O REMÉDIO
MAIS EFICAZ.

